

CAMBIOS TAXONÓMICOS Y NUEVOS REGISTROS DE CLÉRIDOS (INSECTA: COLEOPTERA) DE LA ARGENTINA

TAXONOMIC CHANGES AND NEW DISTRIBUTIONAL DATA OF CLERIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) FROM ARGENTINE

JAIME SOLERVICENS A.¹

RESUMEN

Neotenerus longicollis Pic, 1935 se sinonimiza con *Pelonium fossipenne* Schenkling, 1917, especie que se adscribe a *Riotenerus* Pic, 1935, al que se le confiere estatus genérico. Siguiendo a Barr (*in litt.*) se sinonimiza *Galeruclerus wagneri* Pic, 1933 con *Pyticeroopsis bruchi* Schenkling, 1916 y se valida el género *Pelonium* Spinola, 1844, distinguiéndolo de *Corinthiscus* Fairmaire y Germain, 1861. Se establece por primera vez la presencia de las siguientes especies para la Argentina: *Epiphloeus balteatus* Chevrolat, 1843, *Pelonium fugax* Klug, 1842 y *Pelonium scoparius* Klug, 1842.

PALABRAS CLAVE: Coleoptera, Cleridae, Argentina, Taxonomía, Distribución.

ABSTRACT

Neotenerus longicollis Pic, 1935 is recognized as a junior synonym of *Pelonium fossipenne* Schenkling, 1917, which is assigned to *Riotenerus* Pic, 1935, which is elevated to generic status. Following Barr (*in litt.*), *Galeruclerus wagneri* Pic, 1933 is synonymized with *Pyticeroopsis bruchi* Schenkling, 1916 and the genus *Pelonium* Spinola, 1844 is recognized as a valid taxon different from *Corinthiscus* Fairmaire and Germain, 1861. The following species are cited for the first time for Argentina: *Epiphloeus balteatus* Chevrolat, 1843, *Pelonium fugax* Klug, 1842 and *Pelonium scoparius* Klug, 1842.

KEY WORDS: Coleoptera, Cleridae, Argentine, Taxonomy, Distribution.

Producto de la elaboración de un catálogo de cléridos de la Argentina se han detectado varias situaciones nomenclaturales y nuevos registros de especies para el país que se dan a conocer en esta nota. Cuando hay información disponible se señala la distribución de las especies en localidades o provincias; las citas fuera de la Argentina se señalan sólo a nivel de país.

Subfamilia Enopliinae

Riotenerus Pic, 1935a: 10. **Nuevo estatus.** Se eleva a estatus genérico el subgénero *Riotenerus* Pic, 1935, que se caracteriza por tener antenas finas con maza de tres

artículos, donde 9 y 10 son triangulares, subiguales y el 11 es oblongo y un poco más largo que uno de los anteriores, protuberancia lateral del pronoto poco marcada, tibias sin denticulaciones y dibujos y escultura elitrales particulares. Se designa como especie tipo a *Pelonium? fossipenne* Schenkling, 1917.

fossipenne Schenkling, 1917: 282 (*Pelonium?*). **Nueva combinación;** = *longicollis* Pic, 1935a: 9 (*Neotenerus*). **Nueva combinación y Nueva sinonimia.** ARGENTINA: Jujuy, Entre Ríos, Santiago del Estero y Mendoza.

Pyticeroopsis Schenkling, 1916: 153.

bruchi Schenkling, 1916: 154; = *wagneri* Pic, 1933: 17 (*Galeruclerus*), según Barr (*in litt.*). ARGENTINA: San Luis; **Nueva combinación y Nueva sinonimia.**

Pelonium Spinola, 1844: 347.

Siguiendo a Barr (*in litt.*) se valida este género de Spinola, distinguiéndolo de *Corinthiscus* Fairmaire y

¹ Instituto de Entomología, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Casilla 147, Santiago, Chile.

Germain, al cual se habían subordinado la mayoría de sus especies en los catálogos de Blackwelder (1945) y Corporaal (1950). *Corinthiscus* se reconoce por los ojos finamente facetados, protibias sin denticulaciones y presencia de protuberancias elitrales. *Pelonium* se distingue por presentar ojos grandes y moderada a gruesamente facetados, protibias con denticulaciones o con un diente apical, segmentos 9 y 10 de la antena algo aplanados, triangulares, lobulados o con un proceso alargado.

Las especies argentinas que se adscriben a *Pelonium* son las siguientes:

atronotatum Pic, 1935b: 100. ARGENTINA; Brasil.

ab. *junctum* Pic, 1935b: 101. ARGENTINA.

ab. *separatum* Pic, 1935b: 101. ARGENTINA.

fasciculatum Klug, 1842: 364, t.1, f.2 (*Enoplium*). ARGENTINA: Entre Ríos (Liebig, Pronunciamento), Santiago del Estero; Panamá; Paraguay y Brasil. Se ha excluido la cita de esta especie para Chile por falta de registros que la confirmen.

ab. *cyaneomaculatum* Blanchard, 1844: 94, t.6, f.9. (*Enoplium*). ARGENTINA: Corrientes.

fugax Klug, 1842: 365 (*Enoplium*). ARGENTINA: Entre Ríos (Liebig, Pronunciamento). PRIMERA CITA PARA ARGENTINA; Brasil y Paraguay.

geniculatum Klug, 1842: 360 (*Enoplium*). ARGENTINA: Entre Ríos (Liebig, Pronunciamento), Mendoza (San Rafael), Buenos Aires; Colombia; Brasil; Paraguay y Uruguay. No se considera la cita para Magallanes (Spinola, 1844), por estar muy separada del resto del área de distribución y por falta de registros que la verifiquen.

multinotatum Pic, 1935b: 101. ARGENTINA: Santiago del Estero (Mistol Paso, Averías, Colonia Florencia), Santa Fe (Las Garzas), Entre Ríos (Liebig) y Mendoza (Ñacuñán).

scoparium Klug, 1842: 365 (*Enoplium*). ARGENTINA: Entre Ríos (Liebig). PRIMERA CITA PARA ARGENTINA; Brasil y Paraguay.

tarsale Schenkling, 1900: 407. ARGENTINA; Brasil y Paraguay. No se considera la cita para Magallanes

(Schenkling, 1906) por estar muy alejada del resto del área de distribución y carecer de registros de colecta que la confirmen.

Subfamilia Epiphloeinae

Epiphloeus Spinola, 1841: 75.

Epiphloeus balteatus Chevrolat, 1843: 36. ARGENTINA: Entre Ríos (Liebig, Pronunciamento). PRIMERA CITA PARA ARGENTINA; Brasil.

REFERENCIAS

- BARR F. W., (in litteris). Key to the New World Enopliini Genera (Cleridae).
- BLACKWELDER R., 1945. Checklist of the Coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America, Part 3, pp. 381-391. Smithsonian Institution, Bulletin 185. Washington.
- BLANCHARD E., 1844. Tribu des Malacodermes, Famille des Clairiens. En: Voyage dans l'Amérique Méridionale de M. Alcide d'Orbigny, Vol VI Insectes, pp. 88-96, t. 6.
- CHEVROLAT A., 1843. Description de vingt-quatre nouvelles espèces de Terebriles, pour faire suite a la Monographie des Clairions de M. le Docteur Klug. Annales Société Entomologique de France, deuxième série, tome premier: 31-42.
- CORPORAAL J. B., 1950. Coleopterorum Catalogus, Supplementa. Pars 23: Cleridae. W. Junk, Gravenhage, 373 pp.
- FAIRMAIRE L. Y P. GERMAIN, 1861. Coleoptera Chilensia II : 4.
- KLUG J.C., 1842. Versuch einer systematischen Bestimmung und Auseinandersetzung der Gattungen und Arten der Clerii. einer Insectenfamilie aus der Ordnung der Coleopteren. Akademie der Wissenschaften, Berlín. pp. 259-397.
- PIC M., 1933. Nouveautés diverses. Mém. Exot.-Ent. LXII: 17.
- PIC M., 1935a. Nouveautés diverses. Mém. Exot.-Ent. LXV: 9.
- PIC M., 1935b. Les *Pelonium* Spin. de la republique Argentine (Col. Cleridae). Rev. Soc. Ent. Arg. VII: 99-101.
- SCHENKLING S., 1900. Neue americanische Cleriden. Deutsche Ent. Zeitschr.: 385-409.
- SCHENKLING S., 1906. Die Cleriden des Deutschen Entomol. National-Museums. Deutsche Ent. Zeitschr.: 241-322.
- SCHENKLING S., 1916. Neue Beiträge zur Kenntnis der Cleriden (Col.) IV. Ent. Mitt. V-5/8: 153-154.
- SCHENKLING S., 1917. Neue Beiträge zur Kenntnis der Cleriden (Col.) VI. Ent. Mitt. VI-7/9: 282.
- SPINOLA M., 1841. Monographie des Téréridiles. Revue Zoologique 4: 70-76.
- SPINOLA M., 1844. Essai Monographique sur les Clérites, Insectes. Coléoptères. Gênes. Vol. I, II y Suplemento, 590 pp., 47 pl.